

## Pflichttext

**Lactuflo<sup>®</sup>**

**Wirkstoff:** Lactulose

**Zusammensetzung:** 1 ml Lösung zum Einnehmen enthält 650 mg Lactulose. Sonstige Bestandteile: keine. Lactulose enthält herstellungsbedingt Fructose, Galactose u. Lactose.

**Anwendungsgebiete:** Obstipation, die durch ballaststoffreiche Kost u. andere allgem. Maßn. nicht ausreichend beeinflusst werden kann; Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern; Prophylaxe und Therapie bei portokavaler Enzephalopathie. **Gegenanzeigen:** Darmverschluss, Galactoseintoleranz, bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Lactulose od. sonst. Bestandteilen.

Vorsicht: bei Pat. m. akut-entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen, Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, Pat. m. vererbter Fructose-Intoleranz, Lactase-Insuffizienz oder Glucose/Galactose-Malabsorption. Bei Neugeborenen, Säuglingen u. Kleinkindern ist die autosomal-rezessiv erbliche Fructose-Intoleranz auszuschließen. Bei diesen Patienten kann der unvollständige Abbau zur Fructosämie u. Fructosurie, zu Hypoglykämie u. hypoglykämischen Leber-, Nieren- u. Gehirnschäden führen. **Nebenwirkungen:** Sehr häufig: leichte abdominelle Schmerzen, Meteorismus, Flatulenz zu Beginn der Behandlung. Häufig: Nausea, Erbrechen, Diarrhöe unter höheren Dosierungen. Selten: Hypernatriämie bei Behandlung der portokavalen Enzephalopathie. Nicht bekannt: Überempfindlichkeitsreaktionen, Ausschlag, Juckreiz (Pruritus), Nesselsucht (Urtikaria). Bei langfristiger Einnahme mit anhaltend dünnen Stühlen können Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt mit entsprechenden Folgen auftreten.

**Apothekenpflichtig.**

Stand: April 2023

### **Pharm. Unternehmer:**

MIP Pharma GmbH

Kirkeler Straße 41

66440 Blieskastel