

Fachversion

Lactulose-saar

Wirkstoff: Lactulose

Zusammensetzung: 100 ml Sirup enthalten 65 g Lactulose; *sonstige Bestandteile:* Aromastoffe, gereinigtes Wasser. **Anwendungsgebiete:** Obstipation, die durch schlackenreiche Kost und andere allgemeine Maßnahmen nicht beeinflusst werden kann; Erkrankungen, die eine erleichterte Defäkation erfordern; Prophylaxe und Therapie der portokavalen Enzephalopathie. **Gegenanzeigen:** Ileus, akute entzündliche Magen-Darm-Erkrankungen, Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, Fructose-Intoleranz, Lactase-Insuffizienz, Galactosämie, Glucose/Galactose-Malabsorptionssyndrom. **Nebenwirkungen:** leichte abdominelle Schmerzen, Meteorismus, Flatulenz; unter hoher Dosierung auch Nausea, Erbrechen und Diarrhoe mit Elektrolytstörungen; bei langfristiger Einnahme mit anhaltend dünnen Stühlen können Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt auftreten; selten Hybernatriämie. **Apothekenpflichtig.** (Stand: Februar 2004)